

FURy[®] 20 EW
Insecticida

Se viene FURy[®] la ola que traspasa
el rastrojo y le pone fin a las orugas
que lo habitan.

LES LLEGÓ EL FIN A LAS ORUGAS QUE SE ESCONDÍAN EN EL RASTROJO

Su verdugo: un insecticida formulado en base acuosa para uso en Siembra Directa. Llega rápida y eficazmente donde se encuentra la plaga. No hay oruga que esté a salvo de la ola de FURY® 20EW

Su gran solubilidad le permite traspasar el rastrojo y llegar de forma implacable sin dejar oruga en pie.



¿Por qué Fury 20 EW?

Es una emulsión invertida en base acuosa, diseñado específicamente para suelos de Siembra Directa.

Su concentración (20 %) y su elevado coeficiente octanol / agua conforma un insecticida con un elevado poder de volteo y persistencia.

Su altísima solubilidad penetra el rastrojo, atravesando velozmente al hábitat de las orugas.

Mejora en un 80% la eficiencia de control de orugas presentes en suelos con cobertura de rastrojos debido a su formulación y mayor penetración en la cutícula de los insectos.

Compatible en mezclas con otros insecticidas y herbicidas.

Suelo limpio de Orugas Cortadoras

FURY[®] 20EW

Insecticida

Principio activo: Zetametrina

Clasificación química: Piretroide

Modo de acción: Contacto e ingestión

Concentración: 20 %

Formulación: EW (emulsión de aceite en agua o emulsión invertida en base acuosa).

EFFECTOS OCASIONADOS

Una oruga corta, en su etapa de mayor actividad, de 8 a 10 plantas de Girasol y de 4 a 8 plantas de Maíz.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Piretroide de alta cantidad de isómeros activos; es decir, piretroide depurado.
- ◆ Altísimo coeficiente de octanol / agua.
- ◆ Súper estable ante las diferentes temperaturas.
- ◆ Gran poder de volteo.
- ◆ Eficiente efecto de contacto: mejor penetración en la cutícula de las orugas.
- ◆ Menos ingrediente activo para producir mortandad de orugas.

LAS VENTAJAS DE LA ZETAMETRINA

- ↘ Solubilidad extrema
- ↘ Ágil disponibilidad
- ↘ 100% de estabilidad
- ↘ Efecto de contacto (producto-Insecto)
- ↘ Poder de “Knock-down”
- ↘ Compatibilidad

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis (cm3 / ha)	Momento de aplicación
SOJA	Isoca medidora (Rachiplusia nu) Oruga militar (Spodoptera frugiperda) Oruguita verde (Loxostege bifidalis)	50 – 60	Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Antes de floración con 15 orugas por metro de surco y más de 20 % de defoliación. Desde floración, cuando haya 10 orugas por metro lineal de surco y más de 10 % de daño al follaje.
	Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatilis)	80	
	Barrenador del brote (Epinotia aporema)	100 en mezcla solamente	Antes de la floración cuando se detecte 30 % de brotes atacados y a partir de floración cuando se observen los primeros daños a flores y vainas. Mezclar esta dosis con 650 cm3 de clorpirifós 48 %.
GIRASOL	Orugas cortadoras (Agrotis spp.)	80 – 100	Aplicación preventiva en preemergencia del cultivo.
		80	Aplicación curativa: cuando se registre 1 oruga y 2 plántulas cortadas cada 15 metros de surco
	Isoca medidora (Rachiplusia nu)	100	Cuando se observen 5 orugas por planta.
MAÍZ	Orugas cortadoras (Agrotis spp.)	80 – 100	Aplicación preventiva en preemergencia del cultivo.
		80	Aplicación curativa: cuando se registre 5 % de plántulas dañadas y 2 orugas cada 100 plantas.
	Chinche de los Cuernos (Dichelops furcatus)	250 - 300	se aplica al suelo en la pre siembra
ALGODON	Oruga del capullo (Heliothis sp.)	80 – 100	Cuando el 10 % de los capullos tengan larvas o daños producidos por las mismas o 20 larvas cada 100 plantas.
	Oruga de la hoja (Alabama argillacea)	20 – 30	Cuando se observe una infestación generalizada de 5 orugas por planta. Las dosis indicadas sólo controlan los tres (3) primeros estadios larvales
	Picudo (Anthonomus grandis)	160 – 200	Aplicar con 7 a 10 % de botones florales atacados y/o ante la presencia de 2 adultos. La dosis menor sólo debe ser usada con bajos niveles de infestación. Repetir las aplicaciones hasta que la plaga se encuentre bajo nivel de daño.

*En proceso de registro



Av. Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 - Piso 7. Of 6 | Rosario (2000) - Argentina
Tel.: +54 341 527-1387 | www.ruralco.com.ar

La firma FMC Latinoamérica S.S. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

FURy® 20 EW y FMC® son marcas registradas de FMC Corporation.