



HERO®

INSECTICIDA

DOBLE ACCIÓN DE CONTROL,
DOBLE GOLPE CONTRA LAS PLAGAS.

UN INSECTICIDA SUPERIOR, LLEGÓ A LA SOJA!

Hero® es un Insecticida de probada eficacia que suma Bifentrin y Zetametrina. El modo dual de esta potente combinación le asegura un doble golpe contra las plagas, que otros insecticidas pueden pasar por alto. Actúa por contacto e ingestión en todo el espectro de insectos chupadores y masticadores. La formulación de Hero®, de última generación, aumenta su persistencia en hojas comparado con los piretroides puros. Ponga sus superpoderes en acción. Llegó Hero®. Llegó el Supercontrol.

FLEXIBILIDAD, AMPLIO ESPECTRO DE CONTROL Y VOLTEO: COMBINADOS EN UN SOLO PRODUCTO.

Hero® es un insecticida pre mezcla, que contiene **Bifentrin + Zetametrina**. Esta potente combinación (por el sinergismo de sus moléculas) le otorga una gran velocidad de acción y un amplio espectro de control.

Es un producto que puede ser aplicado en todo el ciclo del cultivo. Su formulación contiene coadyuvantes especiales que le confieren altísimos niveles de control.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja	Chinche verde (Nezara viridula)	80 - 100 cm³/ha	Aplicar la dosis mayor en infestaciones más intensas. Seguir las recomendaciones de umbral de daño, según estados fenológicos.
	Chinche de la alfalfa (Piezodorus guildinii)		
	Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis)	50 - 60 cm³/ha	Aplicar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Aplicar la dosis mayor en infestaciones más intensas. Antes de floración con 15 orugas por metro lineal de surco y más de 20 % de defoliación. Desde floración, cuando haya 10 orugas por metro lineal de surco de 1,5 cm, y más de 10 % de daño al follaje.
	Oruga bolillera (Helicoverpa gelotopoeon)	60 - 70 cm³/ha	
	Oruga medidora (Rachiplusia nu)	50 - 60 cm³/ha	Antes de floración(*): Aplicar cuando se encuentren por lo menos desde 15 orugas de más de 1,5 cm, por metro lineal de surco y más de 20 % de defoliación. Desde floración(*): Aplicar cuando se encuentren por lo menos 10 orugas de más 1,5 cm, por metro lineal de surco y más de 10 % de daño al follaje.
	Arañuela roja (Tetranychus urticae)	100 cm³/ha	Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se detecte el inicio de la infestación (menos de 15 arañuelas por folíolo en al menos el 30 % de las hojas). Bajo condiciones de estrés en etapas vegetativas tempranas, aplicar ni bien se detecte la presencia.
Maíz	Trips negro o Trips del poroto (Calliothrips phaseoli)	100 cm³/ha	Aplicar, para reducir la población en R3 y R5 (mayor influencia sobre el rendimiento), cuando aparezcan 10 trips adultos por folíolo en la parte media de la planta. Repetir en caso de reinfestaciones.
	Chinche de los cuernos (Dichelops turcatus)	150-200 cm³/ha	Aplicar antes de la emergencia del cultivo. Utilizar la menor dosis cuando se haya detectado 1 chinche/m2* y la mayor dosis ante infestaciones superiores o preventivamente en lotes con ataques el año anterior.

PRESENTACIÓN 4 BOTELLAS X 5 LT



La firma FMC Química S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

Hero® y FMC son marcas registradas de FMC Corporation.