

INSECTICIDA – ACARICIDA



Concentrado Emulsionable

COMPOSICION

mercaptopion:

0,0 dimetil - ditioposfato de dietilmercaptosuccinato100 g.

solvente y emulsionante

c.s.p.....100 ml.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 33.250


N° de Lote: Ver envase

Cont. Neto: 1 L / 20 L

Fecha de Vencimiento: Ver envase

Origen: ARGENTINA

INFLAMABLE DE 3ra. CATEGORIA



CHEMINOVA AGRO DE ARGENTINA S.A.

Aldecoa N° 1277 – (B1868DTO) Avellaneda

Buenos Aires – Argentina

Tel.: (+5411) 4228-7047/53/58 – Fax.: (+5411) 4209-8844

www.cheminova.com.ar

IMPORTANTE: En caso de duda, consultar a la agencia local del INTA o a un técnico especializado. **Cheminova Agro de Argentina S.A.** ofrece el insecticida-acaricida **Lupara®** elaborado cuidadosamente según rigurosas normas de calidad. Siendo su aplicación efectuada sin intervención de la Empresa, en condiciones y con medios variables. **Cheminova Agro de Argentina S.A.** no asume ninguna responsabilidad por el uso y empleo del producto distinto de lo indicado en esta etiqueta.



Color de la banda: PMS Amarillo C
Símbolo de peligro: Cruz de San Andrés
Clasificación del peligro y Palabras: NOCIVO

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: No comer, no beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto directo con los ojos, piel, y boca. **LUPARA**® sin diluir puede dañar los ojos. Se deberá usar guantes de goma, overol, botas y máscara cuando se está aplicando este producto. No destapar picos o boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse de ropa y calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces. Guardar el sobrante de **LUPARA**® en su envase original, bien cerrado.

Protección respiratoria



Guantes protectores



Protección de gafas



Otra protección



RIESGOS AMBIENTALES:

TOXICIDAD PARA ABEJAS: ALTAMENTE TÓXICO. Trasladar las colmenas a 4 km del área de aplicación, durante 30 días. No aplicar con abejas presentes. Dar aviso a los apicultores antes de la aplicación para el cierre de las colmenas. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo.

TOXICIDAD PARA PECES: MUY TÓXICO. No aplicar directamente sobre espejos de agua, ni en áreas donde exista agua libre en superficie. Dejar una franja de seguridad de 5 metros entre el cultivo y el espejo de agua. Evitar derrames en curso de agua. No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

TOXICIDAD PARA AVES: MODERADAMENTE TÓXICO. No debe aplicarse en áreas donde se hallan aves alimentándose o en reproducción. No realizar aplicación aérea sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES:

Realizar esta tarea con ropa adecuada, protección ocular, botas y guantes de goma. Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua. Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1 en 10 (caldo remanente: agua de lavado) o bien asperjar sobre caminos de tierra, suelo roturado o barbechos para su descomposición natural. No realizar la descarga del lavado sobre canales de desagüe o fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.



TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento **3 veces**. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben reunirse bien identificados en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos y/o envases vacíos de Agroquímicos para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto envases y desechos.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase original bien etiquetado y cerrado bajo llave, en lugar fresco y seco, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. No almacenar en casa habitada, tampoco en lugares con temperaturas superiores a 25°C e inferiores a 0°C.

DERRAMES:

En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, crear una barrera de contención del derrame. Señalizar la zona afectada, prohibir el acceso a personas ajenas, niños y animales.

Utilizar indumentaria apropiada para la limpieza (protector facial, máscara con filtro para polvos, guantes y botas de goma). Se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber cubriendo con arena, aserrín, turba, etc., u otro material inerte. Esparcir el material absorbente, palear o barrer y recoger el producto en recipientes o bolsas, que luego serán roturados/as para su disposición final y posterior destrucción por empresas autorizadas. No quemar a cielo abierto.

Lavar a fondo la superficie contaminada con detergente y un poco de agua o agua carbonatada. Envasar luego el agua del lavado.

Evitar que el producto penetre en cursos de agua, ya sean quietas o en movimiento, de riego o domésticas. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, contactarse con el Centro Toxicológico más cercano. Colocar al paciente en un lugar ventilado. Tener a mano el envase del producto, etiqueta u Hoja de Datos de Seguridad del material cuando llame al número de teléfono del centro de control de intoxicación o al médico.

- **En caso de contacto con la piel:** quitar toda la ropa y calzado contaminados. Lavar con abundante agua y jabón, o con agua bicarbonatada (diluir una cucharada soper, aprox. 15 g de NaHCO₃ en 1 L de H₂O) las partes del cuerpo y ropa que hubieran tomado contacto con el producto, inclusive cabellos
- **En caso de ingestión:** Dar atención médica de inmediato. No inducir al vómito, pues está formulado con solventes. Si la persona está inconsciente, no administrar nada por vía oral y asegúrese que pueda respirar sin dificultad. NO impedir el vómito en caso que esto ocurra espontáneamente.
- **En caso de contacto con los ojos:** Quitar previamente lentes de contacto, en caso de poseerlos. Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, haciéndolos mover lentamente en todas las direcciones. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos.
- **En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre, recostándola en un lugar bien ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal (efectuar respiración artificial o dar oxígeno, si la respiración es dificultosa)

En todos los casos, procurar asistencia médica

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO, CLASE II.

CLASE INHALATORIA III – CUIDADO

PRODUCTO MINIMAMENTE IRRITANTE OCULAR. Grupo químico: organofosforado

Aplicar tratamiento para organofosforados. ANTÍDOTO: inyectar por vía intravenosa 2 a 4 mg de sulfato de atropina o sucedáneo como bromuro de homatropina en dosis equivalentes y repetir hasta que aparezcan signos de atropinización (sequedad de piel, mucosas, rubicundez, pupilas dilatadas, taquicardia de 100 por minuto y no mayores de 140 por minuto).

Síntomas de intoxicación aguda: Náuseas, vómitos, irritación gastrointestinal, irritación del tracto respiratorio, irritación de los ojos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:



- **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”:** Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires- TEL: 0-800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777 – Asistencia personal y telefónica las 24 hs.
- **UNIDAD DE TOXICOLOGIA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”:** Gallo 1330 - CP 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 4962-2247/6666 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs.
- **CENTRO TOXICOLÓGICO PERMANENTE - T.A.S. – CASAFAE:** Tucumán 1544 – CP 2000 - Rosario. Sta Fe. - Tel: (0341) 4480077 / 4242727. ó 0800-888-TOXI (8694) – Asistencia telefónica las 24 hs
- **SERVICIO DE TOXICOLOGIA – Hospital Escuela “José de San Martín”:** Paraguay 2201 - CP 1120 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 5950-8804/8806 - Tel: (011) 5950-8800/04/06 int. 480 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs.
- **CIQUIME – Centro de Información Química para Emergencias:** TEL: 0800-222-2933 / (011) 4613-1100 - Asistencia telefónica las 24 hs.
- **SERVICIO DE TOXICOLOGIA – Hospital Municipal de Urgencias:** Catamarca 441 - CP 5000 – Córdoba - TEL: (0351) 4276200 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs.
- **HOSPITAL DE NIÑOS.** Tel: (0351) 458-6400 - Córdoba

GENERALIDADES:

El insecticida acaricida alifático **LUPARA®** es un compuesto órganofosforado que actúa por contacto e ingestión. Forma parte de los insecticidas "de contacto" al absorberse por intermedio de los lípidos del caparazón de los insectos, además, es de gran uso en la agricultura debido a su escasa persistencia en el medio ambiente y a su gran actividad.

Posee un amplio espectro de control y moderada acción residual. Su estabilidad a la luz y su resistencia al lavado por lluvias permiten controlar reinfestaciones posteriores al tratamiento.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC): Inhibidor de la Acetilcolinesterasa

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACION:

- Verificar fecha de vencimiento antes de abrir el envase.
- Agitar bien antes de usar.
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen, y poner a funcionar el sistema de agitación.
- Verter la cantidad necesaria de **LUPARA®**, según dosis, en el tanque de la pulverizadora a medio llenar, y luego completar el volumen remanente de agua, que siempre debe ser limpia.
- Verificar que el sistema de agitación esté en constante movimiento durante toda la aplicación, para mantener la suspensión.
- Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- No asperjar el fungicida cuando hay fuerte viento o sol, o esté a punto de llover.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

- **Aplicación terrestre:** **LUPARA®**, puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras manuales o motorizadas, autopropulsadas o de arrastre, con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo de agua de 80 - 100 l/Ha y una presión de 40 - 50 lb/pg²
- **Aplicación aérea:** Con medios aéreos (avión o helicóptero) provistos con equipo pulverizador apropiado. Emplear un volumen mínimo de agua de 10 Lts/Ha. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h.

Es de suma importancia el correcto funcionamiento y calibración de la máquina empleada, de manera tal de asperjar el caudal en forma correcta y uniforme. Siendo **LUPARA®** un insecticida no sistémico, es fundamental lograr una correcta cobertura de la superficie o cultivo, para asegurar la plena eficacia del tratamiento. Los caudales deben ser adecuados a las especificaciones de fábrica de los equipos, al grado de desarrollo del cultivo y a las condiciones ambientales imperantes.

Número de gotas: Aplicar 30 a 40 gotas/cm².

Lavado de equipos: Es importante realizar la limpieza del equipo una vez terminada la aplicación. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar el equipo completamente. Lavar prolijamente el tanque, mangueras y picos con agua limpia y humectante no iónico. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta 1/4 de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el líquido por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales, cultivos o pasturas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Isoca de la alfalfa (<i>Colias lesbia</i>)	600 cm ³ /ha	7	Al encontrar más de 30 orugas en 20 pasadas de red.
	Pulgón de la alfalfa (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Pulgón negro de las leguminosas (<i>Aphis craccivora</i>)	850 - 1000 cm ³ /ha		Cuando se observen los primeros focos.
Algodón	Gusano cogollero (<i>Heliothis virescens</i>)	1500 - 2000 cm ³ /ha		Antes de que las orugas alcancen 2 cm de longitud.
	Oruga de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>)	200 - 300 cm ³ /ha		Al aparecer las larvas.
	Picudo del algodónero (<i>Anthonomus grandis</i> Boheman)	1000 cm ³ /ha		1° tratamiento: con los primeros botones florales 2° tratamiento: 5 días posteriores a la 1ra. aplicación 3° tratamiento: 5 días posteriores a la 2da. aplicación 4° tratamiento: 5 días posteriores a la 3ra. aplicación
Cítricos o citrus	Cochinilla blanca del tronco (<i>Unaspis citri</i>) Cochinilla coma	150 cm ³ /hl		7

	<p>(<i>Mytilococcus beckii</i>) Cochinilla del delta (<i>Lecanium deltae</i>) Cochinilla harinosa (<i>Pseudococcus maritimus</i>) Cochinilla roja australiana (<i>Aonidiella aurantii</i>) Cochinilla roja común (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>)</p>			
	<p>Cochinilla hache (<i>Saissetia oleae</i>) Cochinilla negra circular de los citrus (<i>Chrysomphalus ficus</i>)</p>	<p>110 - 150 cm³/hl</p>		<p>Pulverizar en primavera y verano al producirse los nacimientos de las ninfas. Entre los tratamientos dejar pasar de 5 a 7 días. Es conveniente adicionar a la dosis 1000 cm³ de aceite emulsionable.</p>
	<p>Mosca americana (<i>Anastrepha fraterculus</i>) Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)</p>	<p>400 cm³/hl</p>		<p>Al aparecer los primeros nacimientos. Aplicación terrestre (con cebo atractivo): utilizar melaza o proteína hidrolizada. Pulverizar 1 m² de la copa en el sector orientado al N.E., ya sea planta o fila por medio. Comenzar 10 días antes de ponerse "pintona" la fruta. Aplicación aérea (con cebo atractivo): 500 a 530 cm³/ha. Utilizar proteína hidrolizada, pulverizar franjas alternadas de 30 m de ancho en igual forma que la indicada para aplicaciones terrestres.</p>

	Mosca blanca (<i>Aleurothrixus floccosus</i>)	40 - 60 cm ³ /hl		Al observar el ataque.
	Pulgón de los naranjos (<i>Toxoptera citricida</i>)	60 - 75 cm ³ /hl		Al observar la presencia de la plaga.
	Trips (<i>Thrips spp.</i>)			Al final de floración.
Duraznero	Cascarudo del duraznero (<i>Anomala testaceipes</i>)	75 - 100 cm ³ /hl	10	En primavera al observar las primeras ninfas.
	Cochinilla blanca del duraznero (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	125 - 150 cm ³ /hl		Al aparecer los primeros nacimientos.
	Mosca americana (<i>Anastrepha fraterculus</i>) Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	400 cm ³ /hl		Aplicación terrestre (con cebo atractivo): utilizar melaza o proteína hidrolizada. Pulverizar 1 m ² de la copa en el sector orientado al N.E., ya sea planta o fila por medio. Comenzar 10 días antes de ponerse "pintona" la fruta. Aplicación aérea (con cebo atractivo): 500 a 530 cm ³ /ha. Utilizar proteína hidrolizada, pulverizar franjas alternadas de 30 m de ancho en igual forma que la indicada para aplicaciones terrestres.

	<p>Pulgón negro del duraznero (<i>Brachycaudus persicae</i>)</p> <p>Pulgón pardo del duraznero (<i>Brachycaudus schwartzi</i>)</p> <p>Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (<i>Myzus persicae</i>)</p>	60 - 75 cm ³ /hl		En primavera, cuando se nota la aparición de la plaga, sobre larvas recién nacidas.
Florales	<p>Cochinilla de los helechos (<i>Pinnaspis aspidistae</i>)</p>	110 - 150 cm ³ /hl	S/R	<p>Pulverizar en primavera y verano al producirse los nacimientos de las ninfas.</p> <p>Entre los tratamientos dejar pasar de 5 a 7 días. Es conveniente adicionar a la dosis 1000 cm³ de aceite emulsionable.</p>
	<p>Pulgón del crisantemo (<i>Macrosiphoniella sanborni</i>)</p> <p>Pulgón del rosal (<i>Macrosiphum rosae</i>)</p> <p>Arañuela roja común (<i>Tetranychus telarius</i>)</p>	65 cm ³ /hl		Al observar la presencia de la plaga.
	<p>Trips de los invernáculos (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)</p>	60 - 75 cm ³ /hl		Al notarse la aparición de la plaga. No aplicar en floración ni con temperaturas superiores a 30°C.
	<p>Trips del gladiolo (<i>Thrips simplex</i>)</p>			Desde que la planta alcanza unos 5 cm de altura hasta antes de la floración.

Forestales	Bicho canasto (<i>Oiketicus platensis</i>)	75 - 87,5 cm ³ /hl		Cuando aparezcan las larvas recién nacidas.
	Bicho quemador (<i>Hylesia nigricans</i>)	100 cm ³ /hl		Cuando se nota la aparición de la plaga, sobre larvas recién nacidas.
Frutales de pepita (Pera y Manzana)	Bicho quemador (<i>Hylesia nigricans</i>)	100 cm ³ /hl	10	Cuando aparezcan las larvas recién nacidas.
	Bicho quemador (<i>Hylesia nigricans</i>)	100 cm ³ /hl		En primavera al observar los ataques.
	Cochinilla roja australiana (<i>Aonidiella aurantii</i>)	150 cm ³ /hl		En primavera y verano. Aplicar en mezcla con 0,5% de aceite emulsionado o 0,16% de aceite emulsivo.
	Gusano de la pera y la manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	75 - 150 cm ³ /hl		De acuerdo con el Servicio de Alarma regional, al observar mariposas en las trampas o cuando han caído 3/4 partes de los pétalos.
	Piojo de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	150 cm ³ /hl		En primavera al aparecer las primeras ninfas. Mezclar con 500 cm ³ de aceite emulsionable.
	Psílido del peral (<i>Cacopsylla pyricola</i>)	75 - 90 cm ³ /hl		Previo a la floración.
	Pulgón lanígero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	60 - 75 cm ³ /hl		Al observar las primeras lanosidades.

	Trips del peral (<i>Taeniothrips inconsequens</i>)			Luego de yema hinchada, cada 8 - 10 días.
	Cochinilla harinosa (<i>Pseudococcus sp.</i>)	110 cm ³ /hl + Aceite Mineral 1%		Realizar tres aplicaciones, la primera en Floración; la segunda en Cuaje; la tercera en Fruto Chico.
Granos almacenados	Gorgojo amarillo de la harina (<i>Tenebrio molitor</i>) Palomita de los cereales (<i>Sitotroga cerealella</i>) Polilla de la harina (<i>Ephestia kuehniella</i>) Taladrillo de los granos (<i>Rhizopertha dominica</i>) Tribolio confuso (<i>Tribolium confusum</i>)	Ver Momento de aplicación	S/R Período de seguridad: 20-30 hs.	Tratamiento preventivo: 10 a 20 cm ³ /tn. Tratamiento de silos, depósitos, molinos o bodegas vacías: pulverizar con una emulsión de 1000 cm ³ en 100 l de agua. Cerrar el local y volver a abrir pasadas 5 horas. Tratamiento de camiones, vagones, acoplados, maquinarias, etc.: pulverizar con una emulsión de 2500 cm ³ /100 litros. Protección de semillas y granos almacenados en bolsas y estibas: utilizar una emulsión de 3000 cm ³ /100 l rociando el piso donde se asentará la estiba y luego la parte superior de cada camada de bolsas.
Hortalizas (Cebolla, Poroto, Repollo, Tomate)	Acaro tejedor (<i>Tetranychus urticae</i>) Arañuela roja (<i>Tetranychus telarius</i>)	65 cm ³ /hl	3	Al observar las primeras arañas.
	Bicho moro de la papa (<i>Epicauta</i>)	500 cm ³ /ha		Al observar el ataque.

	<i>adspersa</i>)			
	Pulgón de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Pulgón del repollo (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	65 cm ³ /hl		Al observar los primeros pulgones en el cultivo.
	Trips de la cebolla (<i>Thrips tabaci</i>) Trips del poroto (<i>Caliothrips phaseoli</i>) Trips del tomate (<i>Frankliniella schultzei</i>)			Al observar los primeros ataques.
Pasturas	Tucuras (<i>Dichroplus spp.</i>)	1200 - 1500 cm ³ /ha	7	Al estado de mosquita y/o saltona. El momento más oportuno de iniciar los tratamientos es a los 15 días de producirse las primeras eclosiones o cuando se estime eclosionada ya la mayor parte de los desoves y antes de que la tucura comience a dispersarse. Los tratamientos deberán efectuarse a la mañana lo más temprano posible y/o en las últimas horas de la tarde, de preferencia durante la noche. Se suspenderán cuando la velocidad del viento sea superior a los 12 km/hora. No es necesario retirar el ganado de los campos a tratar. Los animales que hubieran pastado en campos tratados podrán ser faenados al cabo de 10 días.

Soja	Chinche de la alfalfa (<i>Piezodorus guildinii</i> West.), Chinche verde (<i>Nezara viridula</i> L.), Chinche marrón o de los cuernos (<i>Dichelops furcatus</i>), Alquiche chico (<i>Edessa meditabunda</i>), Alquiche grande (<i>Edessa rufomarginata</i>)	800 cm ³ /Ha Lupara + 40 cm ³ /Ha Archer Plus (gamma cialotrina 15% CS)	26	Aplicar a partir de R3 (formación de vainas) hasta R8 (plena madurez). Ver tabla orientativa, Fuente: EEA INTA Oliveros
Sorgo azucarado	Siete de Oro (<i>Astylus atromaculatus</i>)	500 cm ³ /ha	7	Al observar el ataque.
Sorgo granífero - rafir	Mosquita del sorgo (<i>Contarinia sorghicola</i>)			Cuando hayan aparecido el 90% de las panojas y el 10% de ellas tenga florecido el cuarto superior.

Soja: Número de individuos mínimo de Chinchas/m lineal para iniciar los tratamientos

Estado fenológico	Grupo de Madurez	Distancia Entre Líneas		
		70 cm	52 cm	26 a 35 cm
Inicio de Fructificación hasta máximo tamaño de semillas	III a IV	1	0,8	0,4
Inicio de Fructificación hasta máximo tamaño de semillas	V a VIII	2	1,6	0,8
Máximo tamaño de semillas hasta cosecha	III a IV	3	2,4	1,2
Máximo tamaño de semillas hasta cosecha	V a VIII	6	4,8	2,4

Fuente: EEA INTA Oliveros

RESTRICCIONES DE USO: Florales, y forestales, sin restricciones (S/R)

En caso de tratarse otros cultivos, ver TC en el cuadro de recomendaciones de uso.

“Prohíbese el tratamiento con plaguicidas fumigantes de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosos, durante la carga de los mismos en camiones o vagones y durante el tránsito de éstos hasta su destino” (Disposición N° 3/83 de la ex – Dirección de Sanidad Vegetal)

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia”.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda aguardar el completo secado del rocío de la aplicación sobre las hojas de las plantas tratadas, antes del reingreso al área.

Si es necesario entrar antes de transcurridas las 24-48 horas, utilizar vestimenta de protección adecuada, jamás sin ella.

COMPATIBILIDAD: El insecticida LUPARA® es compatible con la mayoría de los plaguicidas en uso, con excepción de aquellos de reacción alcalina (caldo bordelés, etc.). En caso de mezclas no experimentadas, efectuar previamente una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD: No presenta, en los cultivos y dosis indicadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.



Color de la banda: PMS Amarillo C

Símbolo de peligro: Cruz de San Andrés

Clasificación del peligro y Palabras: NOCIVO