



FMC

Invertimos en la agricultura del futuro

AHORA LA DECISIÓN DE TENER UNA MEJOR COSECHA ESTÁ EN TUS MANOS.

Presentamos la máxima protección en el cultivo de la vid. Llegó **Avaunt**[®] el insecticida que logra un excelente control de Lobesia.

Invertimos en la agricultura del futuro.

Avaunt 

INSECTICIDA

Un nuevo producto para el máximo control de Lobesia en vid.

Generalidades:

Avaunt® es un insecticida de nueva generación para el control de Lobesia en el cultivo de la vid. El ingrediente activo de **Avaunt®**, indoxacarb, pertenece a una nueva familia química las Oxadiacinas. Su modo de acción único, es efectivo por contacto directo, ingestión o por contacto con los depósitos del residuo seco de la superficie foliar.

Atributos principales:

- **Impide que las larvas se sigan alimentando.**
- **Es efectivo sobre diferentes estadios de la plaga.**
- **Bajo impacto sobre enemigos naturales y ácaros.**
- **Flexibilidad de aplicación.**
- **Corto período de reingreso.**

Composición.

Indoxacarb 30% p/p WG
Granulado Dispersable

Recomendaciones de uso.

Avaunt® debe aplicarse de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Vid	Polilla de la vid (Lobesia botrana)	17-20 g/hl*	Comenzar las aplicaciones al inicio de la oviposición. Bajo condiciones de alta presión de plaga, realizar una segunda aplicación a los 14 días posteriores. Aplicar dentro de un programa de rotación de activos con diferente modo de acción.

***Garantizar una dosis mínima de 170 gr/ha**

Con **Avaunt®** podemos ofrecer una óptima flexibilidad de aplicación, contrariamente a los IGRs, para los que el momento de aplicación es un punto clave.

Degradación Indoxacarb en uvas variedad Chardonay. Mendoza, año 2013.

Producto aplicado: Indoxacarb 30%. Dosis: 20 gr/hl.



Degradación Indoxacarb en uvas variedad Malbec. Mendoza, año 2013.


Producto aplicado: Indoxacarb 30%. Dosis: 20 gr/hl.



Eficacia de diferentes modos de acción ó grupos de insecticidas a los diferentes estadios en el ciclo de lobesia botrana.



Con altas presiones se recomienda reemplazar la primera aplicación de **Avaunt®** por **Coragen®**.



AVAUNT PUEDE SER APLICADO 3 A 5 DÍAS DESPUES DEL INICIO DEL VUELO: INICIO DE OVIPOSTURA *1
POR SU FLEXIBILIDAD AVAUNT TAMBIEN PUEDE SER APLICADO 10-11 DÍAS DESPUES DE INICIO DEL VUELO: CABEZA NEGRA

*1 El Grupo de los IGR, tiene eficacia sólo en este momento.

PRODUCTO BANDA AMARILLO

Recuerde las siguientes recomendaciones para lograr un mejor uso y un manejo mucho más seguro de nuestra línea de productos:

- SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE SU EMPLEO.
- USAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS.
- MANTENER LOS PRODUCTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN, ES IMPORTANTE LLEVAR LA ETIQUETA AL MÉDICO.

