



SE VIENE MUSTANG 20 EW, LA OLA QUE TRASPASA EL RASTROJO Y LE PONE FIN A LOS INSECTOS QUE LO HABITAN.

LES LLEGÓ EL FIN A LAS PLAGAS QUE SE ESCONDÍAN EN EL RASTROJO.

Un insecticida formulado en base acuosa para uso en Siembra Directa. Llega rápida y eficazmente donde se encuentra la plaga. No hay oruga ni chinche que este a salvo de la ola de Mustang 20 EW.

SU GRAN SOLUBILIDAD LE PERMITE TRASPASAR EL RASTROJO Y LLEGAR DE FORMA IMPLACABLE SIN DEJAR PLAGA EN PIE.



Oruga verde



Chinche de los cuernos

VENTAJAS:

- ↘ Solubilidad extrema
- ↘ Efecto de contacto (producto-insecto)
- ↘ Ágil disponibilidad
- ↘ Poder de volteo
- ↘ 100% de estabilidad

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis (cm ³ / ha)	Momento de aplicación
SOJA	Isoca medidora (Rachiplusia nu) Oruga militar (Spodoptera frugiperda) Oruguita verde (Loxostege bifidalis) Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis)	70-90	Aplicar con 5 orugas mayores de 2 cm. y hasta 10 orugas menores de 2 cm., preferentemente antes del cierre de surco. Tener en cuenta el estado fenológico, condición hídrica, espaciamiento entre hileras y grupo de madurez.
	Barrenador del brote (Epinotia aporema)	100 en mezcla solamente	Antes de la floración cuando se detecte 30 % de brotes atacados y a partir de floración cuando se observen los primeros daños a flores y vainas. Mezclar esta dosis con 650 cm ³ de dorpiños 48 %.
GIRASOL	Orugas cortadoras (Agrotis spp.)	80 - 100	Aplicación preventiva en preemergencia del cultivo.
	Isoca medidora (Rachiplusia nu)	80	Aplicación curativa: cuando se registre 1 oruga y 2 plántulas cortadas cada 15 metros de surco
MAÍZ	Isoca medidora (Rachiplusia nu)	100	Cuando se observen 5 orugas por planta.
	Orugas cortadoras (Agrotis spp.)	80 - 100	Aplicación preventiva en preemergencia del cultivo.
	Chinche de los Cuernos (Dichelops furcatus)	80	Aplicación curativa: cuando se registre 5 % de plántulas dañadas y 2 orugas cada 100 plantas.
ALGODÓN	Oruga del capullo (Heliothis sp.)	250 - 300	se aplica al suelo en la pre siembra
	Oruga de la hoja (Alabama argillacea)	80 - 100	Cuando el 10 % de los capullos tengan larvas o daños producidos por las mismas ó 20 larvas cada 100 plantas.
	Picudo (Anthonomus grandis)	20 - 30	Cuando se observe una infestación generalizada de 5 orugas por planta. Las dosis indicadas solo controlan los tres (3) primeros estadios larvales
		160 - 200	Aplicar con 7 a 10 % de botones florales atacados y/o ante la presencia de 2 adultos. La dosis menor sólo debe ser usada con bajos niveles de infestación. Repetir las aplicaciones hasta que la plaga se encuentre bajo nivel de daño.

Suelo limpio de orugas cortadoras y chinches.



La firma FMC CORPORATION S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MUSTANG y FMC son marcas registradas de FMC CORPORATION S.A.

fmcargentina.com.ar



APP FMC